

## Augmentin (Spanish)

### **A partir de hoy, sin excepciones:**

Por la mañana y de noche (2x/día):

1. Use el hilo dental
  2. Use cepillo eléctrico (cepille por 4 minutos)
  3. Use el irrigador bucal de WaterPik
  4. Enjuague con el enjuague SmartMouth
- 

### **Como prepararse para su cirugía?**

1. NO VENGA CON EL ESTÓMAGO VACÍO. Asegúrese de desayunar o almorzar.
  2. Comience Augmentin, dos días antes el día de la cirugía. Tome 1 cada 12 horas.
  3. Comience Ibuprofeno de 800mg después de la cirugía. Tome 1 cada 8 horas por 3 días.
  4. Si el dolor es SEVERO, tome ibuprofeno y Tylenol de 500 mg (no necesita receta).  
Tome 2 tabletas de Tylenol 500 mg y 1 tableta de Ibuprofeno de 800 mg cada 8 horas, según sea necesario.
  5. NO tome Tylenol, si el dolor es controlado con ibuprofeno.
- 

Por 4-6 semanas espere seguir una dieta de comida blandita.

No fumar durante 1 semana después de la cirugía.

Visite nuestro sitio de web para videos instructivos: [www.dentallaserchicago.com](http://www.dentallaserchicago.com)