

Que puede esperar después de su Cirugía

- Es normal que sangre durante las próximas semanas. En algunos casos puede sangrar más de dos semanas.
- Sensibilidad puede ocurrir al masticar o al comer alimentos fríos y calientes. Normalmente, pueden ser 6 a 9 meses para que la sensibilidad disminuya.
- En algunos casos, si tiene dolor en algún diente, es probable que necesite terapia del conducto radicular (terapia del nervio). Se recomienda regresar con su dentista particular o consultar con un Endodoncista.
- Si alguno de los rellenos, coronas, parciales o dentaduras están defectuosos o se despegan durante la cirugía o después, debe de consultar con su dentista particular para tratamiento adicionales.
- Después de la cirugía, normalmente la inflamación de las encías disminuye. Puede esperar que las encías se encojan. En algunos casos, los márgenes del diente, el implante o la corona pueden quedar expuestos.
- La movilidad de los dientes aumentará después de la cirugía. Normalmente de 6 a 9 meses después de la cirugía, volverá a la movilidad previa a la cirugía.
- La cirugía de laser es un intento para controlar su enfermedad periodontal (enfermedad de las encías y hueso). No hay garantías de que su enfermedad no regrese. En algunos casos puede ser necesario tratamientos adicionales y se pueden aplicar costos adicionales.

Recuerde que sangrar, hinchazón, y dolor es normal después de la cirugía.

Se tiene alguna pregunta o preocupación, favor de llamarnos al
773-622-3454.